SUPPLEMENT AU DIAGNOSE
DU 15 AVRIL 1977

DIAGNOSE

PERIODIQUE MEDICAL
MENSUEL

Index

Index
1972 - 1976

DIAGNOSE

Index par numéro

N°

1 — Pancréatites aiguës
2 — Coma barbiturique
3 — Vertige de Ménière (crise aiguë)
4 — Scarlatine
5 — Maladie de Bouveret
6 — Crise de migraine
7 — Sciatique paralysante (par hernie discale)
8 — Œdème aigu pulmonaire au cours des états cardio-vasculaires de l'adulte
9 — Hémorragies utérines fonctionnelles préménopausiques (H.U.F.)
10 — Cholécystites aiguës
11 — Etat de mal asthmatique
12 — Déshydratation aiguë du nourrisson
13 — Intoxication par l'amanite
14 — Manifestations articulaires de la goutte aiguë
15 — Fractures du col du fémur chez le vieillard
16 — Maladie de Parkinson
17 — Etat de mal angineux
18 — Crise de tachyarythmie complète
19 — Mononucléose infectieuse
20 — Maladie herpétique
21 — Glaucome aigu
22 — La crise de rhumatisme articulaire aigu (maladie de Bouillaud)
23 — Retards pubertaires
24 — Cardiopathies congénitales 1
— cardiopathies cyanogènes avec shunt droite-gauche
25 — Cardiopathies congénitales 2
— les cardiopathies avec shunt gauche-droite
— les cardiopathies sans shunt
26 — Ramollissements cérébraux
27 — Syndrome néphrotique
28 — Déficiences mentales de l'enfant
29 — Fractures pathologiques de l'adulte
30 — Dépression mélancolique
31 — Ictère par cholestase intra-hépatique (CH.I.H.)
32 — Coma diabétique
33 — Sténose hypertrophique du pylore chez le nourrisson
34 — Pelvi-spondylite rhumatismale au début
35 — Coqueluche du nourrisson
36 — Syncopes vagales d'origine réflexe
37 — L'hypothyroïdie acquise spontanée de l'adulte (myxœdème)
38 — Epistaxis graves
39 — Confusion mentale aiguë symptomatique de tumeur cérébrale
40 — Hémorragies digestives
41 — Maladie de Crohn
42 — Accès maniaque
43 — Pubertés précoces
44 — L'obésité de l'enfant
45 — Menace d'avortement
46 — Torsion aiguë de kyste ovarien
47 — Invagination intestinale aiguë du nourrisson
48 — Rupture de la rate
49 — Broncho-pneumopathie aiguë dyspnéisante du nourrisson
50 — Anévrysme disséquant de l'aorte
51 — Hémorragies génitales de la femme jeune
52 — Sténose carotidienne
53 — Ictère simple du nouveau-né
54 — Septicémies à staphylocoques
55 — Zona ophtalmique
56 — Artériopathies oblitérantes chroniques des membres
57 — Obésité de l'enfant
58 — Syndrome carcinoïdien
59 — Encéphalites virales aiguës chez l'enfant
60 — Hyperlipidémies essentielles
61 — Sclérose en plaques
62 — Hoquet
63 — La crise tétanique du nourrisson
64 — Recto-colite hémorragique
65 — Polyradiculonévrite de GUILLAIN et BARRE
66 — Les éosinophilies parasitaires
67 — Chancre syphilitique
68 — Maladie de BESNIER-BOECK-SCHAUMANN
69 — La rubéole
70 — Les hyperthyroïdies
71 — La maladie de BIERMER
72 — Les leucémies aiguës

INDEX 1972-1976

N°

73 — Polyglobulies
74 — Hernie hiatale étranglée
75 — Laryngite aiguë sous-glottique de l'enfant
76 — Anuries primitives
77 — Coma hypoglycémique de l'adulte
78 — Intoxication digitalique aiguë
79 — Intoxication salicylée chez l'enfant
80 — Dysenterie bacillaire aiguë
81 — Erythème noueux
82 — Lympho-réticulose bénigne d'inoculation
83 — Ictères de la femme enceinte
84 — Endocardite infectieuse lente (JACCOUD-OSLER)
85 — Les hypothyroïdies de l'enfant (Myxœdème)
86 — Mucoviscidose ou maladie fibrokystique du pancréas
87 — Toxoplasmose
88 — Addisonismes aigus
89 — Les leptospiroses
90 — Maladie de PAGET
91 — Le cancer du rein de l'adulte
92 — Syndrome de LYELL
93 — Les gynécomasties
94 — Phéochromocytome
95 — Urticaire
96 — Le tétanos au début
97 — Diagnostic des purpuras chez l'enfant
98 — Diagnostic étiologique des déficiences mentales de l'enfant 1) oligophrénies acquises
99 — Diagnostic étiologique des déficiences mentales de l'enfant 2) oligophrénies endogènes
100 — Maladie de Kahler
101 — Méningite suppurée du nouveau-né
102 — Méningites purulentes du nourrisson
103 — Les insuffisances cortico-surrénales lentes
104 — Crânio pharyngiome
105 — Diagnostic d'une ascite chez l'adulte
106 — Rachitisme
107 — Hématémèse par rupture de varices œsophagiennes
108 — Diabète insipide
109 — Diagnostic des dermatoses bulleuses
110 — Syndrome éclamptique (dernier numéro de 1976)

Index alphabétique

A

ADDISONISMES aigus 88
AMANITE (intoxication par l') 13
ANGINEUX (état de mal) 17
ANURIES primitives 76
AORTE (anévrysme disséquant de l') . 50
ASCITE chez l'adulte (diagnostic d'une) 105
ASTHMATIQUE (état de mal) 11
AVORTEMENT (menace d') 45

B

BARBITURIQUE (coma) 2
BESNIER-BOECK-SCHAUMANN (maladie de) 68
BIERMER (maladie de) 71
BOUILLAUD (maladie de) 22
BOUVERET (maladie de) 5
BRONCHO-PNEUMOPATHIE aiguë dyspnéisante du nourrisson 49

C

CANCER du rein de l'adulte 91
CARCINOIDIEN (syndrome) 58
CARDIOPATHIES CONGENITALES . . 24
CARDIOPATHIES cyanogènes avec shunt droite-gauche 24
CARDIOPATHIES avec shunt gauche-droite 25
CARDIOPATHIES sans shunt 25
CEREBRAUX (ramollissements) . . . 26
CHANCRE syphilitique 67
CHOLECYSTITES aiguës 10
CHOLESTASE INTRA-HEPATIQUE (ictère par) 31
COLITE (Recto-hémorragique) . . . 64

DIAGNOSE

COMA BARBITURIQUE 2
COMA DIABETIQUE 32
COMA HYPOGLYCEMIQUE de l'adulte 77
CONFUSION mentale aiguë symptomatique de tumeur cérébrale 39
CORTICO-SURRENALES lentes (les insuffisances) 103
COQUELUCHE du nourrisson 35
CRANIO-PHARYNGIOME 104
CROHN (maladie de) 41

D

DEFICIENCES mentales de l'enfant . . 28
DEPRESSION mélancolique 30
DERMATOSES bulleuses (diagnostic des) 109
DESHYDRATATION aiguë du nourrisson 12
DIABETE insipide 108
DIABETIQUE (coma) 32
DIGITALIQUE aiguë (intoxication) . . 78
DYSENTERIE bacillaire aiguë 80

E

ECLAMPTIQUE (syndrome) 110
ENCEPHALITES virales aiguës chez l'enfant 59
ENDOCARDITE infectieuse lente (JACCOUD-OSLER) 84
EOSINOPHILIES parasitaires 66
EPISTAXIS graves 38
ERYTHEME NOUEUX 81

F

FRACTURES du col du FEMUR chez le vieillard 15
FRACTURES pathologiques de l'adulte 29

G

GLAUCOME aigu 21
GOUTTE aiguë (manifestations articulaires de la) . . 14
GUILLAIN et BARRE (polyradiculonévrite de) 65
GYNECOMASTIES 93

H

HEMATEMESE par rupture de varices œsophagiennes 107
HEMORRAGIES
— digestives 40
— génitales de femme jeune . . . 51
— utérines fonctionnelles préménopausiques (H.U.F.) 9
HERNIE
— hiatale étranglée 74
— discale (sciatique paralysante par) 7
HERPETIQUE (maladie) 20
HOQUET 62
HYPERLIPIDEMIES essentielles . . . 60
HYPERTHYROIDIES 70
HYPOGLYCEMIQUE (coma) 77
HYPOTHYROIDIE acquise spontanée de l'adulte (myxœdème) 37
HYPOTHYROIDIES de l'enfant . . . 85

I

ICTERE
— par cholestase intra-hépatique (CH.I.H.) 31
— de la femme enceinte 83
— simple du nouveau-né 53
INTOXICATION
— par l'amanite 13
— digitalique aiguë 78
— salicylée chez l'enfant 79
INVAGINATION intestinale aiguë du nourrisson 47

J

JACOUD-OSLER (Endocardite infectieuse lente) . . 84

K

KAHLER (maladie de) 100
KYSTE ovarien (torsion aiguë de) . . 46

L

LARYNGITE aiguë sous-glottique de l'enfant 75
LEPTOSPIROSES 89
LEUCEMIES aiguës 72

DIAGNOSE

LYELL (syndrome de) 92
LYMPHO-RETICULOSE bénigne d'inoculation 82

M

MANIAQUE (accès) 42
MELANCOLIQUE (dépression) . . . 30
MENIERE (vertige de) crise aiguë . . 3
MENINGITE suppurée du nouveau-né . 101
MENINGITE purulente du nourrisson . 102
MENTALES (déficiences) de l'enfant . 28
MIGRAINE (crise de) 6
MONONUCLEOSE infectieuse 19
MUCOVISCIDOSE 86
MYXŒDEME (hypothyroïdie)
— de l'adulte 37
— de l'enfant 85

N

NEPHROTIQUE (syndrome) 27

O

OBESITE de l'enfant 57
ŒDEME aigu pulmonaire au cours des états cardio-vasculaires de l'adulte . 8
OLIGOPHRENIES acquises 98
endogènes . . . 99

P

PAGET (maladie de) 90
PANCREATITES aiguës 1
PARKINSON (maladie de) 16
PELVI-SPONDYLITE rhumatismale au début 34
PHEOCHROMOCYTOME 94
POLYGLOBULIES 73
POLYRADICULONEVRITE de GUILLAIN et BARRE 65
PUBERTAIRES (retards) 23
PUBERTES précoces 43
PURPURAS (diagnostic) chez l'enfant . 97
PYLORE (sténose hypertrophique du) chez le nourrisson 33

R

RACHITISME 106
RAMOLLISSEMENTS cérébraux . . . 26
RATE (rupture de la) 48
RECTO-COLITE hémorragique . . . 64
REIN (cancer du) 91
RETARDS pubertaires 23
RHUMATISME articulaire aigu (crise de) 22
RUBEOLE 69

S

SALICYLEE (intoxication) chez l'enfant . 79
SCARLATINE 4
SCIATIQUE paralysante (par hernie discale) 7
SCLEROSE en plaques 61
SEPTICEMIES à STAPHYLOCOQUES . 54
SHUNT
— droite-gauche (cardiopathies cyanogènes avec) 24
— gauche-droite (cardiopathie avec) 25
— (cardiopathie sans) 25
STENOSE
— carotidienne 52
— hypertrophique du pylore chez le nourrisson 33
SYNCOPES vagales d'origine réflexe . 36
SYPHILITIQUE (chancre) 67

T

TACHYARYTHMIE complète (crise de) . 18
TETANIQUE (la crise) du nourrisson . 63
TETANOS au début 96
TOXOPLASMOSE 87
TUMEUR cérébrale (confusion mentale aiguë symptomatique de) 39

U

URTICAIRE 95

V

VAGALES (syncopes) d'origine réflexe 36
VARICES œsophagiennes (hématémèse par rupture de) 107
VERTIGE de MENIERE (crise aiguë) . 3

glifanan

glafénine

30 et 120 comprimés

Substance originale de synthèse, la glafénine, active par voie orale, est caractérisée par son action antalgique rapide et puissante.

Sa parfaite tolérance digestive permet sa prescription aux ulcéreux gastriques intolérants à l'acide acétylsalicylique, aux autres antalgiques et aux anti-inflammatoires.

Dénuée d'effet hémorragique, elle peut être donnée aux malades sous anti-coagulants.

Sans effet hypnogène, elle permet l'application de traitements de longue durée sans interruption ou diminution d'activité.

N'entraîne ni accoutumance, ni toxicomanie. Ne constipe pas.

La glafénine peut être associée indifféremment à toute autre thérapeutique.

INDICATIONS

Douleurs aiguës et chroniques, plus particulièrement :

- algies rhumatismales
- algies traumatiques
- douleurs post-opératoires
- douleurs dentaires
- douleurs neurologiques
- douleurs viscérales

Algies diverses

Céphalées

POSOLOGIE

Adaptée à la nature et à l'intensité de la douleur.
En pratique on retiendra :

douleurs aiguës : dose d'attaque : 2 comprimés, ensuite 1 comprimé à la demande jusqu'à un total de 5 comprimés par jour.

douleurs chroniques : première prise de 2 comprimés - 3 à 4 comprimés par jour.
Ne pas dépasser 2 comprimés par prise.
Dans les traitements de longue durée, il est conseillé 4 comprimés par jour.

Chez l'enfant : Ne pas utiliser chez les enfants en-dessous de 5 ans.
De 5 à 10 ans : 1/2 comprimé 3 fois par jour.
De 10 à 15 ans : 1 comprimé 3 fois par jour.

MODE D'EMPLOI

Avaler les comprimés avec un grand verre d'eau, de préférence avant le repas. Le comprimé, dénué de saveur, peut, au besoin, être écrasé.

EFFETS SECONDAIRES

Dans certains cas de prise d'une dose élevée, une insuffisance rénale réversible de type tubulo-interstitiel a été rapportée. Ont été signalés exceptionnellement des phénomènes de type allergique, urticaire, œdème de Quincke, choc. Ils contre-indiquent la poursuite ou la reprise de la thérapeutique par la glafénine.

PRECAUTIONS

Comme il est de règle avec toute médication, son emploi par la femme enceinte est à éviter, particulièrement au cours des 3 premiers mois de la grossesse.

Chez les malades souffrant d'une insuffisance rénale, la prudence est recommandée.

ROUSSEL

FORMULE

Glafenin. 200 mg - Lactos. - Fecul. - Amyl. - Talc. - Magnes. Stearas. q.s. pro compres. uno.

NEOMYCINE DIAMANT

comprimés

LABORATOIRES DIAMANT
PARIS

Enregistré par ERFA S.A. - 1040 Bruxelles

amoquine

houdé